

RÉVISION DE QUELQUES MUSCINÉES DU VALOIS. — VII.

Par Paul JOVET.

MOUSSES.

*WEISIA VIRIDULA* (L.) Hedw. — Sur le sol d'une Hêtraie calcaire, Pont-S<sup>te</sup>-Maxence. Sur les vases retirées de l'Ourcq, La Ferté-Milon (Aisne), 16-x-30, avec *Physcomitrella patens*. Sable silico-calcaire, Ormoy-Villers (Carrefour Bourbon) avec *Hymenostomum microstomum*. Talus silico-calcaire, forêt d'Halatte (chemin des Bâtis) avec *Webera nutans*, *Didymodon rubellus*. Surtout sur sol sablonneux siliceux, un peu argileux : dans une coupe de la chênaie silicicole, entre Thury-en-Valois et Antilly (avec *Ditrichum pallidum*). Sur chemins silvatiques frais : forêt de Retz (bois du Tillet, v. *Barbula fallax*) ; Taillis d'Ivors (laie Nicolai, avec *Riccardia sinuata*) ; en lisière du Buisson de Walligny (Chemin de Thury à Ivors, avec *Pleuridium alternifolium*, *Pottia lanceolata*, *Phascum acaulon*, *Riccia sorocarpa*) ; Bois de Bourneville, avec *Breidleria arcuata* ; Bois de l'Ermitage (Ormoy-Villers), abondant, avec *Fossombronia pusilla*. — G. CAMUS : Forêt de Retz (plateau ; près de Longpont). — QUESTIER l'a mentionné sur ses cahiers sous le nom de *Weisia controversa* : il faudrait revoir ses récoltes.

\* *DICRANUM MAJUS* Smith. — Taillis d'Ivors (laie Nicolai), rare, avec *Lophocolea cuspidata* et *Riccardia sinuata*.

*DICRANUM UNDULATUM* Ehrh. — Le Plessis-sur-Autheuil (au-dessus du stand) : fragment de lande à Callune avec *Polytrichum attenuatum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium proliferum*. — GRAVES, Cat. pl. de l'Oise : lisière de la Forêt d'Halatte, au-dessus de Pont-S<sup>te</sup>-Maxence. — JEANPERT : Forêt d'Halatte, entre le Mont-Pagnotte et Fleurines, 25-ix-1896.

*CAMPYLOPUS FLEXUOSUS* (L.) Brid. — Talus siliceux silvatiques : fr., Butte d'Aumont, en plusieurs places assez éclairées, avec *Calluna vulgaris*, *Dicranum scoparium*, *Georgia pellucida*, *Polytrichum juniperinum* ; Haute-Pommeraiie (Carrefour de la Route des Fonds et de la Petite Laie) avec *Cephaloziella byssacea*, *C. papillosa*, *Lophocolea cuspidata*, *L. heterophylla*. Lande à Callune ; Ormoy-Villers. Grès ombragés : Buisson de Walligny (la Tournelle), Le Terny (Ormoy-Villers). Entre les racines des arbres, bois de la

1. L'astérisque (\*) indique les espèces ayant fait, antérieurement, l'objet de remarques (voir *Bulletin Muséum*, fév. et avril 1945).

Cendrée à Longpont (A.). Sur débris ligneux dans une coupe de la Chênaie siliceole entre Thury-en-Valois et Antilly (v. *Ditrichum pallidum*). — GRAVES (Cat.) : Marolles, canton de Betz (QUESTIER), Bois du Tillet. — BESCHERELLE : rochers de grès à Vaumoise, 14-v-1863. — G. CAMUS : forêt d'Halatte, sur sables moyens et supérieurs, 1920 ; Bois entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin (grès), 1913 ; forêt de Retz (1903-1914), Route du Faîte, S. E., angle S.-W., Dampleux, montée de la route de Taillefontaine.

\* *FISSIDENS BRYOIDES* var. *INCONSTANS*. Sch. — Ne vit pas seulement sur les blocs siliceux des rus intermittents du Valois, mais aussi sur le sol glaiso-siliceux des chemins silvatiques frais : entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin (avec *Plectocolea hyalina*) ; plusieurs laies du Bois de Bourneville (avec *Breidleria arcuata*) ; dans une coupe de la Chênaie-Charmaie transformée en Roncier (même bois).

*DITRICHUM PALLIDUM* (Sehrad.) Hamp. — Sol des coupes de la Chênaie siliceole. Forêt de Retz, près de la Laie Neuve. Entre Thury-en-Valois et Antilly, fr., avec *Pleuridium subulatum* ta, *Pogonatum aloides*, *Webera nutans*, *Catharinea angustata*, *Campylopus flexuosus*, *Bryum erythrocarpum*, *Fissidens impar*, *Lophocolea heterophylla*, *L. bidentata*, *Ceratodon purpureus*, *Weisia viridula*. — QUESTIER : forêt de Villers-Cotterets, 1846 (in Herb. Mus. Paris). — JEANPERT : Bois du Tillet, près de Crépy (Rev. Bryol., 1894). — G. CAMUS : forêt de Retz (route de Dampleux, près du premier carrefour), 13-IV-1913.

*ARCHIDIUM ALTERNIFOLIUM* (Dieks.) Sehimp. — Dans un champ (sables auversiens), plateau de Faverolles, limite du Bois de Buehet. Pilots émergés de l'Oise en septembre 1928, estacade de Moru, avec *Tortula latifolia*. Très généralement sur laies forestières fraîches siliceuses : forêt de Retz (Cr. de Retz, v. *Riccia glauca* ; laie Tortuc, avec *Physcomitrium piriforme* ; laie de Chavigny avec *Anthoceros punctatus* ; laie du Château avec *Anthoceros laevis*) ; forêt d'Halatte (chemin Arthus, Mont Alta, légèrement calcaire, avec *Calypogeia Trichomanis*, *Fissidens bryoides*, *F. taxifolius*, *Ctenidium molluscum*, *Campylium chrysophyllum* var. *tenellum* ; lisière sur les champs d'Ivillé, chemin à *Radiola linoides*, *Centunculus minimus*, *Polytrichum piliferum*, *Rhacomitrium canescens* ; Entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin (avec *Plectocolea hyalina*) ; Bois du Roi, entre Rouville et la Maison forestière (v. *Campylopus fragilis*) ; Taillis d'Ivors, laie Nicolaï, avec *Riccardia sinuata*. Lieu siliceux humide, sablière de Fleurines, avec *Dicranella secunda*. — QUESTIER, in Herb. Mus. Paris : Bois de Montigny-l'Allier et Thury. — G. CAMUS : sables et argiles du gypse mélangés, allée du Château (Forêt de Retz), en bel état, fr. 1-III-1914.

**PLEURIDIUM ALTERNIFOLIUM** (Dicks., Kaulf.) Rabenh. — Sol des laies fraîches : forêt de Retz (laie de la Culcée et Laie Tortue, avec *Physcomitrium piriforme* ; laie de Chavigny, avec *Anthoceros punctatus*). Buisson de Walligny : entre les Carrefours des Ornières et de la Genevroie, avec *Fossombronia Wondraczekii* ; en lisière sur le chemin de Thury à Ivors, v. *Weisia viridula*. Taillis d'Ivors : laie Nicolaï, avec *Riccardia sinuata*. Bois de Bourneville (A.), avec *Breidleria arcuata*. Bois du Roi, avec *Plectocolea crenulata*. Entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin, avec *Plectocolea hyalina*. Haute-Pomméraie : Laie de la Maison Noire, v. *Bryum bicolor*. Champ sur sables auversiens, plateau de Faverolles (A.) : limite du Bois du Buchet. — MARCILLY : Chemin de Russy à Gondreville, avril 1859.

\* **PLEURIDIUM NITIDUM** (Hedw.) Rabenh. — Bois de Bourneville (A.), rare, avec *Breidleria arcuata*.

**PLEURIDIUM SUBULATUM** (Huds.) Rabenh. — Sol des laies fraîches : forêt de Retz (Laie Tortue, avec *Physcomitrium piriforme* ; laie de Monthieux, jonction avec la laie de Chavigny, avec *Philonotis fontana* ; Route de Boursonne, v. *Eurhynchium Schleicheri*). Bois de Bourneville (A.) avec *Breidleria arcuata*, fr., Taillis d'Ivors (Les Roches). Coupe d'une Chênaie sur silice, entre Thury et Antilly. Talus siliceux sableux : glaisière des Fouilleux (Fleurines) avec *Cephalozia bicuspidata*, l'Ermitage (Ormoy-Villers) avec *Tritomaria exsectiformis*. — QUESTIER, cahiers manuscrits : Bois de Grivette (Thury-en-Valois), 1857 ; forêt de Retz (Bourfontaine), 1851. — G. CAMUS : forêts d'Halatte et de Retz (près Longpont, Corcy, sur sables de Beauchamp).

**POTTIA LANCEOLATA** (Hedw.) C. Müll. — Sur murs en pierres calcaires et carrières de calcaire grossier : St-Maximin, Gouvieux, Pont-St<sup>e</sup>-Maxence, (avec *Pterygoneuron lamellatum*, *Pottia intermedia*). Talus calcaire terreux : forêt d'Halatte (entrée de la route des Suisses sur Pont-St<sup>e</sup>-Maxence), avec *Tortella inclinata*. Vases retirées de l'Ourcq, La Ferté-Milon (A.) avec *Physcomitrella patens*. Sol des laies fraîches : Buisson de Walligny, entre les Carrefours des Ornières et de la Genevroie (avec *Fossombronia Wondraczekii*) ; chemin de Thury à Ivors (avec *Weisia viridula*). — QUESTIER : Thury-en-Valois et environs, 1847, in Herb. MÉRAT. — L. MARCILLY : Compiègne, 24-11-1862 (in Herb. Mus. Paris). — G. CAMUS : Longpont (A.), forêt de Chantilly, pourtour de la forêt de Carnelle, Pierrefonds.

**POTTIA TRUNCATULA** (L.) Lindb. — Champ siliceux frais : limite du Bois de Buchet (sur le plateau de Faverolles), entre Crépy-en-Valois et Rouville (avec *Anthoceros punctatus*), lisière du Petit Bois d'Haramont. Sur vases retirées de l'Ourcq : La Ferté-Milon (A.) avec *Physcomitrella patens*. Sur sol des laies siliceuses fraîches :

forêt de Retz (Carrefour de Retz, avec *Riccia glauca* ; rare sur la laie de Chavigny, avec *Anthoceros punctatus* ; laie du Château, avec *Anthoceros laevis* ; route de Boursonne, avec *Plectocolea hyalina*, v. *Eurhynchium Schleicheri* ; Buisson de Walligny, entre les Carrefours des Ornières et de la Genevroie). Entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin, avec *Plectocolea hyalina*. — QUESTIER : in Herb. MÉRAT, Thury-en-Valois. — G. CAMUS : forêt de Retz.

TORTELLA NITIDA Lindb. — Mont-Cornon (Oise), fr., v. *Bryum bicolor*.

\* BARBULA FALLAX Hedw. — Sur calcaire grossier : entrée de carrière souterraine et paroi d'un rocher : coteau de Mosloy, face à Silly-la-Poterie (A.) ; tranchées de voies ferrées, paroi à *Leiocolea badensis* ; entre Mareuil-sur-Ourcq et Montigny-l'Allier, et avec *Southbya nigrella* ; près de la laie de Bellevue (forêt de Retz) ; pierre calcaire ombragée avec *Seligeria pusilla*, entrée de carrière, en aval du Vieux Moulin d'Antilly ; chemins calcaires de Thury-en-Valois à la halte (avec *Cratoneuron filicinum* var. *trichodes*) et d'Antilly à Collinances. Sur chemins silvatiques sablonneux ; Haute-Pommeraiie, route Caroline, t. a., v. *Brachythecium salebrosum* ; Bois du Roi, près de la Maison forestière, avec *Poa annua*, *Peltigera horizontalis* ; près du Pont de Ste-Fontaine, t. a., avec *Boeomyces* (st.), *Bryum erythrocarpum* et *Cladonia* en folioles, *Polytrichum juniperinum*, *P. piliferum*, *Rumex Acetosella*, *Calluna*, *Carex ericetorum*, *Dicranum scoparium*, *Tortula ruralis*, *Brachythecium albicans* ; près du Terny (env. d'Ormoy-Villers) et environs du Plémont (env. de Nanteuil-le-Haudouin), bordure de la route et entre les pavés de grès d'un chemin : pelouse à *Poa annua*, *Plantago Coronopus*, avec *Barbula convoluta*, *Ceratodon purpureus*, *Brachythecium albicans*, *Rhacomitrium canescens* r, *Peltigera horizontalis*. Pelouse silico-calcaire (calcaire de St-Ouen et sables auversiens), Bois du Tillet (entre vieux chemin de Crépy et route de Vaumoise). avec *Helianthemum vulgare* et *Veronica spicata*, *Weisia viridula*, *Rhacomitrium canescens*, *Encalypta contorta*, *E. vulgaris*, *Fissidens cristatus*, limite du calcaire de St-Ouen et des sables auversiens.

\* BARBULA HORNSCHUCHIANA Schultz. — Sur calcaire grossier : entrée de carrière souterraine et rocher avec *Southbya nigrella*, coteau de Mosloy, en face Silly-la-Poterie (A.) ; talus de la tranchée du chemin de fer de Mareuil-sur-Ourcq à Montigny-l'Allier, avec *Leiocolea badensis* ; paroi murée sous le pont de la gare, Senlis ; rocher calcaire subsuintant, pente gauche de la vallée de l'Oise, face à St-Leu-d'Esserent. Chemin à sol sableux silico-calcaire, avec *Dicranella varia* r, *Barbula convoluta*, *B. unguiculata* ; Bois des Brais, env. d'Ormoy-Villers.

EPHEMERUM SERRATUM (Schreb.) Hamp. — Eteule siliceuse (blé),

Crépy-en-Valois (chemin de Rouville) avec *Anthoceros punctatus* Sol siliceux frais de la route de Boursonne (forêt de Retz), v. *Eurhynchium Schleicheri*. — QUESTIER : in Herb. Cosson, Thury-en-Valois ; in Herb. MÉRAT, bois de Collinances (à Thury-en-Valois).

FUNARIA OBTUSA (Dick.) Lindb. (= *Enthostodon ericetorum* Br. Eur.). — Laies humides du bois de Bourneville (A.), fr., avec *Breidleria arcuata*.

FUNARIA FASCICULARIS (Dick.) Schimp. — Environs de Nanteuil-le-Haudouin (entre le Bois du Plémont et la Grande Ferme de Versigny), sol siliceux frais, vieux sainfoin : association messicole à *Myosurus minimus*, avec *Phascum acaulon*, *Bryum erythrocarpum*, etc. — Bois de Lévigren, sur chemin glaiso-siliceux couvert d'un « tapis muscinal » avec *Barbula acuta*, *Bryum erythrocarpum*, *Ceratodon purpureus*, Hypnacées, etc.

BRYUM INCLINATUM (Sw.) Br. Eur. — Sur sol frais de la laie Tortue (forêt de Retz), rr, fr, avec *Physcomitrium piriforme*.

BRYUM BICOLOR Dick. (= *Bryum atropurpureum* auct. non Wahlenb.). — Sur sables calcaires : Bois du Tremblay (environs de Creil). Talus muré de la voie ferrée : pont de St<sup>e</sup>-Fontaine (env. d'Ormoy-Villers). Plusieurs fois sur talus siliceux silvatique à *Diplophyllum albicans* (H<sup>te</sup>-Pomméraie, Halatte). Sur terre brune dérivée du calcaire de St-Ouen, plateau de Mont-Cornon (Oise), fr. abondamment, avec *Ditrichum flexicaule*, *Camptothecium lutescens*, *Tortella nitida*. Sur sables siliceux gris brun de la Laie de la Maison Noire (H<sup>te</sup>-Pomméraie), fr., pa, avec *Ceratodon purpureus*, *Pleuridium alternifolium* fr. rr, *Barbula convoluta*, *Marchantia polymorpha*, *Lophocolea heterophylla*, *L. cuspidata*, *Barbula unguiculata*, *Mnium rugicum*, *Funaria hygrometrica*. — G. CAMUS (1913) : murs à Nanteuil-le-Haudouin ; Longpont (A.) ; ruines romaines d'Orrouy.

MNIOBRYUM CARNEUM (L.) Limpr. — Talus marneux suintant : forêt d'Halatte, entre les Poteaux des Dames et d'Ivillé, 6-xi-32, avec *Dicranella varia*. Antilly : entrée des carrières souterraines de calcaire grossier. Senlis : sous le pont de la gare, paroi murée de la voie ferrée. Forêt de Retz : route de Boursonne, v. *Eurhynchium Schleicheri*. — MARCILLY : forêt de Villers-Cotterets, route Droite, 3-iv-1859. — G. CAMUS : Orrouy, vieilles carrières de calcaire grossier, 22-ix-1912.

\* MNIMUM RUGICUM (Laur.) emend. Tuomik. — Talus siliceux à *Diplophyllum albicans*, *Rhytidiadelphus loreus*, *Oxyrrhynchium Swartzii*, *Eurhynchium Schleicheri* ; Route de Boursonne (forêt de Retz). Sol glaiso-sableux siliceux frais : laie de la Maison-Noire (H<sup>te</sup> Pomméraie) avec *Marchantia polymorpha*, *Barbula convoluta*, *Bryum capillare*, *B. bicolor*, *Pleuridium alternifolium*, *Webera nutans* r, *Ceratodon purpureus*, *Lophocolea cuspidata*. Sur chemin

calcaire traversant la Chênaie-Frênaie-Ormaie, rive gauche du vallon de Glaignes, avec *Cratoneuron filicinum* var. *trichodes*.

\* CATHARINEA ANGUSTATA Brid. — Sol des laies siliceuses. Entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin (avec *Plectocolea hyalina*) Forêt d'Halatte : route Bourbon (avec *Tillæa muscosa* et *Breidleria arcuata*) ; la Queuc aux Renards. Environs de Rouville : Sainte-Fontaine (avec *Jamesoniella autumnalis*). Bois de Bourneville (A.), avec *Breidleria arcuata*. Taillis d'Ivors, laie Nicolaï, avec *Riccardia sinuata*, et « Les Roches ». Bois du Lieutenant, route Colleraie, chemin à *Breidleria arcuata*.

POGONATUM URNIGERUM (L.) Palis. — Bien que récolté en forêt de Retz par G. CAMUS : allée du Château, limite des sables de Beauchamp et argiles, rr, mal développé, par ROZE et BESCHERELLE, n° 144, fr., (1862, 1864) et par JEANPERT (15-XII-1893), route de Soissons, talus sablonneux et carrière de sable, je ne l'ai identifié qu'une fois : rare sur les laies silvatiques fraîches argilo-sableuses du Bois de Bourneville (avec *Breidleria arcuata*). Les indications manuscrites de QUESTIER concernant la forêt de Retz (route du Faîte, au-dessus de Villers-Cotterets ; Route Tortue, près de la Route du Faîte ; mare aux Fougères) auraient besoin d'être confirmées.

BRACHYTHECIUM SALEBROSUM (Hoffm.) Bryol. eur. — Sol des chemins silvatiques. Sur sable siliceux gris : env. de Rouville, chemin de Ste-Fontaine (près du chemin de Boissy). Sol sableux silico-calcaire : Hte-Pommeraiie, route Caroline, avec *Abietinella abietina*, *Didymodon rubellus*, *Barbula fallax*, *Cratoneuron filicinum* fr.. Talus ombragé par Chênaie à *Quercus pedunculata*, *Cornus mas* et *Mercurialis perennis*, forêt d'Ormoy-Villers, avec *Dicranum scoparium*.

\* BRACHYTHECIUM GLAREOSUM (Bruch.) Bryol. eur. — Substrat de calcaire grossier : blocs ombragés, sentier de Moulin l'Œillette à Longpré (A.) ; pierres fraîches, chemin de fond d'une carrière à St-Maximin ; entrée de carrière souterraine : cotéau de Mosloy, env. de Silly-la-Poterie (A.) ; murette ruinée en voie de boisement, avec *Campylium hispidulum* var. *Sommerfeltii*, *Oxyrrhynchium pumilum* : Antilly ; paroi murée, voie ferrée, sous le pont de la gare : Senlis. Pelouse silico-calcaire (sables auversiens et calcaires marneux de St-Ouen), avec *Thuidium Philiberti*, *Didymodon rubellus*, et des espèces silicicoles, Sainte-Fontaine (env. de Rouville). Talus silico-calcaire, Bois du Tremblay (env. de Creil). Talus siliceux humifère, route de Betz au Bois de Montrolle. Laies silvatiques humides : Bois de Bourneville (A.), avec *Breidleria arcuata* ; entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin, rare.

EURHYNCHIUM SCHLEICHERI (Hedw. fil.) Lor. — Souvent considéré comme variété de l'*Oxyrrhynchium praelongum*. Cette espèce semble

préférer les substrats siliceux. Talus silvatiques siliceux : forêt d'Halatte, fr., chemin de St-Barthélemy ; forêt de Retz : Route Droite (à la traversée du taillis d'Ivors et au Rond des Dames), route de Boursonne : 1<sup>o</sup> vers Boursonne, avec *Diplophyllum albicans*, *Oxyrrhynchium Swartzii*, *Rhytidiadelphus loreus*, *Mnium rugicum*, *Lophocolea cuspidata* et une vingtaine d'autres muscinées ; entre Route Droite et Route Tortue, fr. — Sables silico-calcaires, éclairés : Crépy-en-Valois (sablière près de la route de Lévignen). — Pierres calcaires ombragées (à *Seligeria pusilla*) et vieille souche : étang d'Oigny (A.). — Sur laies fraîches : forêt de Retz (Laie Tortue avec *Carex strigosa*, *Eurynchium Stokesii*, *Brachythecium rutabulum* var. *robustum* ; Route de Boursonne au Rond des Dames avec *Carex strigosa*, *Ephemerum serratum*, *Pleuridium subulatum*, *Pottia truncatula*, *Physcomitrium piriforme*, *Mniobryum carneum* ; taillis d'Ivors : « Les Roches » ; Laie Nicolaï, avec *Riccardia sinuata* ; entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudouin, avec *Plectocolea hyalina*. — G. CAMUS : Pont-St<sup>e</sup>-Maxence (entrée de la forêt d'Halatte, 1903) ; forêt de Retz (route de Taillefontaine, 1904, et vers Longpont, 1913) ; également forêts de Carnelle et de Compiègne.

OXYRRHYNCHIUM PUMILUM (Wils.) Broth. — Terre, pierres et murs de calcaire grossier : en aval d'Antilly (avec *Brachythecium glareosum*, *Campylium hispidulum* var. *Sommerfeltii*) ; Senlis (parc de Valgenceuse et La Fontaine aux Malades, avec *Tortula marginata*) ; Forêt d'Halatte (au-dessus de Pontpoint) ; déversoir de l'étang de Bourq (env. de la Ferté-Milon (A.), avec *Gyroweisia tenuis* ; forêt de Retz (entre Eméville et Bonneuil-en-Valois) ; env. de Villers-Cotterets (chemin creux de Pisseleux à Noue). Sol silico-calcaire : parc de Montlaville (env. de Creil), en plusieurs endroits, taillis à *Mercurialis perennis*, avec *Eurhynchium striatum*, *Oxyrrhynchium Swartzii* ; bois de Thury-en-Valois (sol décalcifié). Pente tuffeuse ruisselante (avec *Cratoneuron glaucum*) ; Fontaine St-Martin (Forêt de Retz, près de Fleury, A.). Talus marneux suintant, forêt d'Halatte (entre Poteaux des Dames et d'Ivillé), avec *Dicranella varia*. Grès recevant sporadiquement des eaux calcaïques ou situés au contact du calcaire grossier : Antilly, vallon de Grivette (bois à *Corydalis solida*, avec *Homalia trichomanoides*, *Rhynchostegium confertum*, *Brachythecium populeum*) ; entre Bonneuil-en-Valois et Eméville ; env. de Thury-en-Valois, rus intermittents de la Garenne Carrière, ravin de Collinances et Bois Pierrot (ou Bois de Fontaine) avec *Campylium hispidulum* var. *Sommerfeltii*, *Isothecium viviparum*, *Plagiochila asplenoides*, *Homalia trichomanoides*, *Thamnium alopecurum*. Talus siliceux à *Diplophyllum albicans*, forêt de Retz : route de Boursonne (avec *Oxyrrhynchium Swartzii*). Cette Hypnacée n'est donc pas très rare. —

G. CAMUS : pierrailles de calcaire grossier, forêt de Retz, partie voisine de Longpont (A.) 1913.

Bien qu'assez communes, certaines espèces sont mentionnées dans cette révision, parce que les anciens bryologues ne la signalèrent pas (ou très rarement), telles *Oxyrrhynchium pumilum* qui passa probablement inaperçue et *Eurhynchium Schleicheri* dont la légitimité spécifique n'était pas reconnue. Semblent nouvelles pour la dition : *Tortella nitida*, *Funaria obtusa*, *F. fascicularis*, *Bryum inclinatum*.

*Laboratoire de Cryptogamie du Muséum.*

*Le Gérant : Marc ANDRÉ.*